Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Carneiro, Susana Maria da Silva

Contribuição para o estudo da vegetação lenhosa do Tejo Internacional

https://minerva.ipcb.pt/handle/123456789/822

Metadados

Data de Publicação 1999

Resumo A região do Tejo Internacional tem sido considerada, no contexto nacional, de grande importância ao nível da conservação da natureza. Tendo, recentemente, sido colocada a hipótese de criação de uma área protegida nesta região, pretende-se com este trabalho efectuar uma caracterização preliminar da vegetação lenhosa e desta forma, contribuir para o correcto ordenamento e gestão deste espaço natural. Foram efectuados inventários florísticos, utilizando a rede viária disponível, tendo sido identif...

Editor IPCB. ESA

Palavras Chave Tejo Internacional, Vegetação lenhosa, Pyro bourgaeana-Querceto rotundifoliae

Tipo report

Revisão de Pares Não

Coleções ESACB - Engenharia de Ordenamento dos Recursos Naturais

Esta página foi gerada automaticamente em 2024-04-20T07:12:09Z com informação proveniente do Repositório

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA VEGETAÇÃO LENHOSA DO TEJO INTERNACIONAL

Engenharia de Ordenamento dos Recursos Naturais

Relatório do Trabalho de Fim de Curso

Susana Maria da Silva Carneiro

CASTELO BRANCO

1999

ÍNDICE

Agradecimentos
Resumo
Abstract
Índice de Figuras
Índice de Tabelas

1. Introdução 2
2. Caracterização da Área 5
2.1. Delimitação da Área 5
2.2. Caracterização Climática 7
2.3. Relevo, Hidrografia e Solos 9
3. Caracterização da Vegetação do Tejo Internacional 12
3.1. Bioclimatologia 12
3.2. Biogeografia 13
3.3. Caracterização das Séries de Vegetação 15
3.3.1. Série do Sobreiro 16
3.3.2. Série da Azinheira 19
3.3.3. Série do Freixo 22
3.3.4. Série do Salgueiro 23
3.3.5. Série do Tamujo 24
4. Material e Métodos 27
5. Resultados e Discussão 31
5.1. Características das parcelas 31
5.1.1. Declive e tipo de exposição 31
5.1.2. Solos 32
5.2. Lista de espécies 33
5.3. Espécies mais frequentes 35
5.3.1. Abundância-Cobertura 35
5.3.2. Altura 36
5.4. Estratos de Vegetação 37
5.4.1. Abundância – Cobertura por tipos de estratos 38
5.4.2. Altura por tipo de estrato 38
5.4.3. Espécies dominantes por estrato 39

5.5. Comunidades 40
5.5.1. Tipos de comunidades 40
5.5.2. Espécies dominantes por tipo de comunidade 44
5.6. Fitossociologia 45
6. Considerações finais 53
Bibliografia 54

Anexos

Resumo

A região do Tejo Internacional tem sido considerada, no contexto nacional, de grande importância ao nível da conservação da natureza. Tendo, recentemente, sido colocada a hipótese de criação de uma área protegida nesta região, pretende-se com este trabalho efectuar uma caracterização preliminar da vegetação lenhosa e desta forma, contribuir para o correcto ordenamento e gestão deste espaço natural.

Foram efectuados inventários florísticos, utilizando a rede viária disponível, tendo sido identificado como espécies mais frequentes *Lavandula sampaiana, Quercus rotundifolia, Retama sphaerocarpa, Cytisus* e *Cistus salvifolius.* As formações mais representativas na área são os montados, matos e olivais. A maioria das comunidades vegetais identificadas pertence à série *Pyro bourgaeana-Querceto rotundifoliae Sigmetum.*

Palavras-chave: Tejo Internacional, vegetação lenhosa, *Pyro bourgaeana-Querceto rotundifoliae Sigmetum.*